



УКРАЇНА

(19) UA (11) 59243 (13) A

(51) 7 A61K31/00, A61B17/56

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ**ОПИС**
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВІНАХІДВидається під
відповідальність
власника
патенту**(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА**

1

2

(21) 20021210290

(22) 19 12 2002

(24) 15 08 2003

(46) 15 08 2003, Бюл. № 8, 2003 р.

(72) Філатов Андрій Михайлович, РЛ, Фіщенко Володимир Олександрович, Кириченко Василь Іванович, Ладонько Юлій Леонідович, Фіщенко Олександр Володимирович

(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ МІ ПИРОГОВА

(57) Спосіб лікування остеохондрозу хребта, що полягає у введенні лікарських засобів, який відрізняється тим, що вводять Traumeel S внутрішньом'язово 2,2мл через день, всього 10 ін'єкцій, Zeel T паравертебрально 2,2мл через день в найбільш болючі ділянки хребта з захопленням всього сегмента, всього 10 ін'єкцій і Discus compositum для внутрішньовенного введення на аутокрові в кількості 2,2мл двічі на тиждень, всього 10 ін'єкцій

Винахід відноситься до медицини і може використовуватися в травматології та ортопедії для лікування остеохондрозу хребта

Відомий спосіб лікування остеохондрозу хребта полягає у підшкірному паравертебральному введенні Traumeel S по 2,2мл та Discus compositum по 2,2мл в один день у симетричні больові точки, Zeel T по 1,0мл справа та зліва від хребта (всього 2,0мл) при наступній блокаді, кратність блокад 3 рази в 1 та 2 тижні, 2 рази - на 3 та 4 тиждень. Всього по 5 ін'єкцій Traumeel S, Discus compositum та Zeel T (див. Моцарь С.И., Игнатьев Е.О. Опыт применения антигомотоксических препаратов Traumeel S, Zeel T, Discus compositum в терапии деформирующих артрозов, спондилоартрозов и остеохондроза позвоночника // Биологическая терапия - 2000 - №2 - С 34-42)

Проте, при застосуванні відомого способу не завжди можна досягти зменшення болю та стійкого анальгетичного ефекту у хворих з вираженим больовим корінцевим синдромом на протязі першого тижня лікування та значно покращити загальний стан пацієнтів по закінченню курсу лікування

В основу винаходу „Спосіб лікування остеохондрозу хребта" поставлене завдання шляхом зміни схеми введення антигомотоксичних препаратів Traumeel S, Discus compositum, Zeel T досягти вираженого анальгетичного ефекту у хворих з нерорефлекторними проявами остеохондрозу хребта в перші дні лікування, досягти значного стійкого покращення загального стану по закінченню курсу лікування. Поставлене завдання здійснюється

способом лікування остеохондрозу хребта, що полягає у введенні лікарських засобів, який відрізняється тим, що вводять Traumeel S внутрішньом'язово 2,2мл через день, всього 10 ін'єкцій, Zeel T паравертебрально 2,2мл через день в найбільш болючі ділянки хребта з захопленням всього сегмента, всього 10 ін'єкцій і Discus compositum для внутрішньовенного введення на аутокрові в кількості 2,2мл двічі на тиждень, всього 10 ін'єкцій. Це дозволить зменшити клінічні прояви остеохондрозу хребта, досягти стійкої ремісії захворювання, покращити якість життя хворих

Спосіб лікування остеохондрозу хребта з використанням Traumeel S, Discus compositum, Zeel T застосовується таким чином

Після попереднього пальпаторного виявлення больових точок повздож хребта та широкої обробки спиртом цих місць проводять підшкірне паравертебральне введення Zeel T по 2,2мл в симетричні больові точки через день, всього 10 ін'єкцій. Traumeel S вводять внутрішньом'язово в кількості 2,2мл через день після трьох кратної обробки спиртом місця введення препарату - у верхнезовнішній квадрант сідниці, всього 10 ін'єкцій. Накладають венозний джгут на середню третину плеча, обробляють спиртом та пунктують одну з ліктьових вен шприцом, набирають 5мл венозної крові і в цей ж шприць добирають 2,2мл Discus compositum, перемішують, знімають джгут і вводять внутрішньовенно Discus compositum двічі на тиждень, всього 10 ін'єкцій

Клінічний приклад хвора Камінська В.Б., 42 роки поступила в 1-е травматологічне відділення

(19) UA (11) 59243 (13) A

Вінницької МКЛ №2 з діагнозом остеохондроз хребта з переважним ураженням поперекового відділу, больовий синдром (медична карта стаціонарного хворого №10480) Хвора скаржиться на виражений біль в поперековому відділі хребта, який віддає в ліву ногу

Анамнез хворіє на протязі декількох років, коли вперше з'явився біль в поперековому відділі хребта Лікувалася амбулаторне з використанням протизапальних препаратів, фізпроцедур Не дивлячись на проведені лікування, покращення носило короточасний характер У зв'язку з посиленням болю госпиталізована у травматологічне відділення для стаціонарного лікування

Клінічно виявлялося обмеження рухів в поперековому відділі хребта із-за болю, пальпація паравертебральних точок в поперековому відділі

хребта болюча, біль виражена більше зліва, позитивні симптоми натягу зліва

Лікування орієнтуючись на больові точки в поперековому відділі хребта, проведені підшкірні паравертебральні блокади цієї ділянки з Zeel T по 2,2мл через день В цей ж день вводили Traumeil S в внутрішньом'язово в кількості 2,2мл через день, всього 10 ін'єкцій та Discus compositum по 2,2мл вводили внутрішньовенно на аутокрові в кількості 2,2мл двічі на тиждень, всього 10 ін'єкцій

Результат після перших ін'єкцій препаратів хвора відчула значне зменшення болю в поперековому відділі хребта, наприкінці 1 тижня після початку лікування наступило виражене покращення самопочуття Через 4 тижні у хворої відзначається відсутність больового синдрому та неврологічних проявів захворювання, стійка ремісія