

Міністерство охорони здоров'я України  
ДУ «Український державний науково-дослідний інститут  
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»  
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  
Українська асоціація боротьби з інсультом



ПЕРШИЙ  
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС

---

**«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  
ФОРУМ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ  
ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ  
ЕКСПЕРТИЗИ»**

---

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ

---

**28–29 березня  
2013 року**

м. Київ

## МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВНАСЛІДОК ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Шевчук В.І., Забур'янова В.Ю., Вернигородська М.В., Проскуріна О.Ф.

Науково-дослідний інституту реабілітації інвалідів (НІЛК)

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

---

**Мета:** вивчити стан реабілітації інвалідів працездатного віку з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) і бронхіальною астмою (БА).

**Методи:** статистичний, логічний, метод експертних оцінок.

**Результати:** проаналізовано медико-експертну документацію 1117 чол., в т.ч. 221 чол., визнаних інвалідами вперше (132 з ХОЗЛ і 89 з БА) та 796 чол., визнаних інвалідами повторно (252 з ХОЗЛ і 544 з БА) за 2011 р. в Житомирській області. Встановлено, що в контингентах інвалідів внаслідок ХОЗЛ і БА рекомендації з медичної реабілітації (відновна терапія) були надані в 100% випадків. При ХОЗЛ рекомендації з працевлаштування (в основному в звичайних умовах виробництва з наданням відповідних умов праці) були визначені 71,9% інвалідів (серед інвалідів 2 групи – 79,5%, 3 групи – 70,8%); при БА – 51,5% інвалідів (серед інвалідів 2 і 3 групи відповідно 44,3% і 54,1%). Рекомендації з професійного навчання надані 8,3% осіб з ХОЗЛ і 9,6% осіб з БА. На обліку у МСЕК перебуває 38 інвалідів внаслідок ХОЗЛ (9,9% всіх інвалідів з ХОЗЛ) і 67 інвалідів внаслідок БА (10,6%), які потребують професійної реабілітації. В той же час всього 16 осіб з ХОЗЛ і 46 осіб з БА пройшли професійну реабілітацію та були працевлаштовані. Перевірено працевлаштування 107 інвалідів внаслідок ХОЗЛ (серед яких виявилось 24 чол., працевлаштованих нерационально) і 67 інвалідів внаслідок БА. Рекомендації з соціальної реабілітації визначені 34,4% інвалідів з ХОЗЛ і 22,6% інвалідів з БА.

Показник повної реабілітації в контингенті переоглянутих осіб з ХОЗЛ склав 8,6% (частково реабілітованих не було); з БА – 4,2% (частково реабілітовано 11,5%). Індивідуальну програму реабілітації (ІПР) розроблено для всіх інвалідів, проте серед інвалідів внаслідок ХОЗЛ вона була виконана лише в 83,8% випадків, внаслідок БА – в 94,5%. Крім того, для контингенту інвалідів з ХОЗЛ характерною є невелика частка осіб, у яких ІПР виконана повністю – 17,2% (при БА – 46,7%).

**Висновки:** реабілітація інвалідів, особливо внаслідок ХОЗЛ, проводиться недостатньо та потребує вдосконалення.