

**Міністерство охорони здоров'я України
Донецький національний медичний університет
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії
Асоціація ортопедів-травматологів України**

**Ministry of Health Service of Ukraine
Donetsk National Medical University
Research and Development Institute of Traumatology and Orthopedics
Association of Traumatologist and Orthopedists of Ukraine**

Травма

**ТРАВМА
TRAUMA**

**Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал
Заснований у 2000 році**

Том 18, № 1, 2017

**Scientific and practical reviewable journal
Founded in 2000 year**

Volume 18, № 1, 2017

**Періодичність виходу 6 разів на рік
Periodicity 6 numbers per year**

Включений в наукометричні і спеціалізовані бази даних Ulrichsweb Global Serials Directory, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat, PИИЦ (Science Index), Google Scholar, «Джерело», Academic Resource Index (Research Bible), «КіберЛенінка», НБУ ім. В.І. Вернадського, CrossRef, Universal Impact Factor, General Impact Factor, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), SHERPA/RoMEO, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)



Травма

Спеціалізований рецензований
науково-практичний журнал

Том 18, № 1, 2017

DOI: 10.22141/1608-1706.1.18.2017

p-ISSN 1608-1706,

e-ISSN 2307-1397

Передплатний індекс: 96022



Засновник журналу:

Донецький національний медичний
університет

Адреса редакції:

Україна, 04107, Київ, а/с № 74

Телефон: +38 (044) 223-27-42

www.mif-ua.com

<http://trauma.zaslavsky.com.ua>

Електронні адреси для звертань

З питань публікації статей

traumajournal@gmail.com

hurzufkonf@gmail.com

medredactor@i.ua

З питань передплати

info@mif-ua.com

тел.: +38 (044) 223-27-42,

+38 (067) 325-10-26

*З питань розміщення реклами
та інформації про лікарські засоби*

reclama@mif-ua.com

office@zaslavsky.kiev.ua

golubnichayan@gmail.com

*Журнал внесено до переліку наукових
фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747*

*Рекомендовано до друку та до поширення
через мережу Інтернет вченою радою
Донецького національного медичного університету,
протокол № 1 від 26.01.2017 р.*

Російською, українською та англійською мовами

*Свідоцтво про державну реєстрацію
сер. КВ № 15994-4466Р. Видано Міністерством юстиції
України 02.11.2009 р.*

Формат: 60×84/8. Ум. друк. арк. 13,02.

Зам. 2017-травня-80. Тираж 8000 прим.

Видавець Заславський О.Ю.

Адреса для листування: а/с 74, м. Київ, 04107

Адреса реєстрації: пр. Ленінський, 25/126,
м. Донецьк, 83102

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 2128 від 13.05.2005

Друк: ТОВ «Ландпрес»

Вул. Алчевських, 2, м. Харків, 61002

Головний редактор
КЛИМОВИЦЬКИЙ В.Г.

Заступник головного редактора
ТЯЖЕЛОВ О.А.

Відповідальний секретар
ГОНЧАРОВА Л.Д.

Редакційна колегія

Бур'янов О.А. (Київ), Веселий С.В. (Лиман),
Гайко Г.В. (Київ), Гур'єв С.О. (Київ),
Думанський Ю.В. (Лиман), Корж М.О. (Харків),
Кондратенко П.Г. (Лиман),
Климовицький Ф.В. (Лиман),
Лоскутов О.Є. (Дніпро),
Петряєва О.Б. (Лиман),
Радченко В.О. (Харків), Страфун С.С. (Київ),
Хвисяк О.М. (Харків), Черниш В.Ю. (Лиман),
Чернишова О.Є. (Лиман)

Редакційна рада

Анкін М.Л. (Київ), Вирва О.Є. (Харків),
Голка Г.Г. (Харків), Грицай М.В. (Київ),
Левицький А.Ф. (Київ),
Поворознюк В.В. (Київ), Рой І.В. (Київ),
Сулима В.С. (Івано-Франківськ), Сухін Ю.В. (Одеса),
Філіпенко В.А. (Харків), Шимон В.М. (Ужгород)

Editor-in-chief

KLYMOVYTSKY V.G.

Deputy chief editor

TYAZHELOV O.A.

Executive editor

GONCHAROVA L.D.

Editorial Board

Buryanov O.A. (Kyiv), Vesely S.V. (Lyman),
Gayko G.V. (Kyiv), Goncharova L.D. (Lyman),
Guriev S.O. (Kyiv), Dumansky Yu.V. (Lyman),
Korzh M.O. (Kharkiv), Kondratenko P.G. (Lyman),
Klymovytsky F.V. (Lyman),
Loskutov O.Ye. (Dnipro),
Petryaeva O.B. (Lyman),
Radchenko V.O. (Kharkiv), Strafun S.S. (Kyiv),
Hvysyuk A.M. (Kharkiv), Chernysh V.Yu. (Lyman),
Chernyshova O.Y. (Lyman)

Editorial Council

Ankin M.L. (Kyiv), Vyrva O.E. (Kharkiv),
Golka G.G. (Kharkiv), Grytsay M.V. (Kyiv),
Levitsky A.F. (Kyiv), Povoroznyuk V.V. (Kyiv),
Roy I.V. (Kyiv), Sulima V.S. (Ivano-Frankivsk),
Sukhin Yu.V. (Odesa), Filipenko V.A. (Kharkiv),
Shimon V.M. (Uzhgorod)

Редакція не завжди поділяє думку автора публікації. Відповідальність за вірогідність фактів, власних імен та іншої інформації, використаної в публікації, несе автор. Передрук та інше відтворення в якій-небудь формі в цілому або частково статей, ілюстрацій або інших матеріалів дозволені тільки при попередній письмовій згоді редакції та з обов'язковим посиланням на джерело. Усі права захищені.

© Донецький національний медичний університет, 2017

© НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, 2017

© Заславський О.Ю., 2017

Зміст

ЮБІЛЕЇ

- Владимир Акимович Филиппенко
(к 60-летию со дня рождения) 6

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

- Вниманию авторов! Как повысить цитирование
ваших работ: фокус на ORCID 8

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Курінний І.М., Страфун О.С., Тимошенко С.В.
Лікування ізольованих переломів
capitulum humeri в дорослих пацієнтів
із застосуванням мікрогвинтів 10

- Страфун О.С.
Лікування кальцифікуючого тендиніту
сухожилків ротаторної манжети плечового
суглоба 19

- Філіпенко В.А., Танькут В.О.,
Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
Причини вивиху головки ендопротеза
після первинного ендопротезування
кульшового суглоба 27

- Король С.О., Матвійчук Б.В., Бурлука В.В.
Сучасні підходи до хірургічного лікування
бойової травми кисті
на етапах медичної евакуації 34

- Масленников С.О., Головаха М.Л., Черный В.Н.
Изучение степени интеграции мягких тканей
в элементы из углерод-углеродного
композитного материала в зоне перехода
внутренней и наружной среды
при имплантации
эндо-экзопротезов 39

- Король П.О.
Роль параметрів остеосцинтиграфії в діагностиці
імплант-асоційованих параендопротезних
ускладнень при ендопротезуванні кульшових
та колінних суглобів 58

- Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е.,
Синяченко О.В.
Влияние гонартроза на течение
и эффективность лечения варикозной
болезни вен нижних конечностей 63

- Кондратюк В.М.
Оцінка резистентності до антимікробних
препаратів штамів *Acinetobacter baumannii*
та *Pseudomonas aeruginosa*, що контамінують
бойові поранення кінцівок 68

Contents

JUBILEE

- Volodymyr Akymovych Fylypenko
(on the 60th anniversary of his birth) 6

OFFICIAL INFORMATION

- To the attention of the authors! How to increase
the citation of your works: focus on ORCID 8

ORIGINAL RESEARCHES

- I.M. Kurinnyi, O.S. Strafun, S.V. Timoshenko
The treatment of isolated fractures
of capitulum humeri in adult patients
using microscrews 10

- O.S. Strafun
Treatment of calcific
tendinitis of rotator cuff
tendons 19

- V.A. Filipenko, V.O. Tankut,
V.O. Mezentsev, O.M. Ovchinnikov
Causes of dislocation
of the endoprosthesis head
after primary hip arthroplasty 27

- S.O. Korol, B.V. Matviichuk, V.V. Burluka
Modern approaches to the surgical
treatment of combat injuries of the hand
at the stages of medical evacuation 34

- S.O. Maslennikov, M.L. Golovakha, V.N. Chorniy
Study of the degree of integration
of the soft tissue into the elements
of carbon-carbon composite material
in the transition zone of the external
and internal environment during implantation
of endo-exoprosthetics 39

- P.O. Korol
The role of bone scintigraphy parameters
in the diagnosis of implant-associated
paraendoprosthetic complications
in hip and knee arthroplasty 58

- Yu.O. Syniachenko, G.Ye. Samoilenko,
O.V. Syniachenko
Influence of gonarthrosis on the clinical course
and treatment efficiency of varicose vein
of lower limb 63

- V.M. Kondratiuk
Evaluation of antimicrobial resistance
of *Acinetobacter baumannii* and *Pseudomonas*
aeruginosa strains, which contaminate
combat wounds of the extremities 68

Литвишко В.О., Попсуйшапка О.К. Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії	74
---	----

Егудина Е.Д., Синяченко О.В., Ермолаєва М.В., Чернышова О.Е., Полесова Т.Р., Ханюков А.А. Сосудисто-реологические свойства крови при анкилозирующем спондилите	80
---	----

ОГЛЯД

Чистик Т.В. Опыт клинического применения кетопрофена в терапии острой и хронической боли	47
---	----

ЛІКАРЮ, ЩО ПРАКТИКУЄ

Канзюба А.И., Шамова Т.А. «Переломы несостоятельности» тазового кольца	87
--	----

Кудиєвський А.В., Головаха М.Л., Шишка І.В., Масленников С.О. Роль женщины в дорожно-транспортном травматизме (аналитический обзор)	93
--	----

Солоницын Е.А., Климовицкий Ф.В., Проценко В.В. Метастазы анонимного рака в длинные кости конечностей: подходы к обследованию и лечению	97
--	----

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Чернышева О.Е., Герасименко В.В., Климовицкий Ф.В., Полесова Т.Р., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Кривошеева В.В., Павлов Е.Н. Медицинские симуляторы и манекены как элемент обучения студентов практическим навыкам в педиатрии	103
---	-----

Чернышова О.Е., Климовицкий Ф.В., Полесова Т.Р., Балычевцева И.В., Самойленко И.Г., Герасименко В.В., Павлов Е.Н., Кривошеева В.В., Хапченкова Д.С. Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів	106
--	-----

АНОНСИ

VIII Міжнародний медичний форум — вибір лідерів галузі охорони здоров'я	112
--	-----

Вимоги до оформлення статей	109
Медицинская книга	111

V.O. Lytvyshko, O.K. Popsuishapka Formation of a periosteal regenerate after a shaft fracture according to the comparative data of ultrasonography and radiography	74
--	----

Ye.D. Iegudina, O.V. Syniachenko, M.V. Ermolaeva, O.E. Chernyshova, T.R. Polesova, A.A. Khaniukov Vascular rheological properties of the blood in ankylosing spondylitis	80
---	----

REVIEW

T.V. Chystyk Experience in the clinical use of ketoprofen in the treatment of acute and chronic pain	47
---	----

TO GENERAL PRACTITIONER

A.I. Kanziuba, T.A. Shamova «Insufficiency fractures» of the pelvic ring	87
--	----

A.V. Kudievsky, M.L. Golovakha, I.V. Shishka, S.O. Maslennikov Place of woman in traffic accidents (analytical overview)	93
---	----

E.A. Solonitsyn, F.V. Klimovitskiy, V.V. Protsenko Anonymous cancer metastases in the long bones of the limbs: approaches to the screening and treatment	97
---	----

PROBLEMS OF HIGH SCHOOL

O.Ye. Chernyshova, V.V. Gerasymenko, F.V. Klymovytsky, T.R. Polesova, I.G. Samojlenko, I.V. Balychevtseva, D.S. Hapchenkova, V.V. Kryvosheieva, E.N. Pavlov Medical simulators and mannequins as an element of teaching practical skills in pediatrics	103
--	-----

O.Ye. Chernyshova, F.V. Klymovytsky, T.R. Polesova, I.V. Balychevtseva, I.G. Samoylenko, V.V. Gerasymenko, E.N. Pavlov, V.V. Kryvocheieva, D.S. Hapchenkova The use of Interactive teaching methods in the training of pediatricians	106
--	-----

ANNOUNCEMENTS

VIII international medical forum — the choice of healthcare industry leaders	112
---	-----

Guidelines for submitting articles	109
Medical Book	111

Кондратюк В.М.

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів *Acinetobacter baumannii* та *Pseudomonas aeruginosa*, що контамінують бойові поранення кінцівок

Резюме. Актуальність. Бойові поранення кінцівок, кількість яких стрімко зростає з 2014 року, часто ускладнюються розвитком хірургічної інфекції. Сучасною тенденцією є зростання частки неферментуючих грамнегативних паличок серед етіологічних чинників госпітальних хірургічних інфекційних ускладнень. **Мета дослідження:** обґрунтувати вибір раціональної антибактеріальної терапії та профілактики спричиненої цими мікроорганізмами госпітальної хірургічної інфекції поранень кінцівок. **Матеріали та методи.** У трьох військово-медичних клінічних центрах (міста Київ, Львів, Вінниця) проведено аналіз результатів бактеріологічних досліджень бойових поранень. Аналіз стійкості до антибіотиків та профілів резистентності проводили відповідно до рекомендацій EUCAST та національних рекомендацій з інфекційного контролю. Порівняння резистентності до окремих препаратів проводили за критерієм Пірсона χ^2 . **Результати.** Проаналізовано результати 326 бактеріологічних обстежень, з яких отримано дані про 378 мікроорганізмів. Частка паличок роду *Acinetobacter* та роду *Pseudomonas* сягає 40 % серед усього спектра контамінант бойових поранень кінцівок. За станом чутливості до різних хіміотерапевтичних препаратів більшість ізолятів належить до полірезистентних або штамів із розширеною резистентністю. Рекомендації з антибактеріальної терапії госпітальних хірургічних інфекцій, до яких входить монотерапія карбапенемами та комбінації з включенням цефалоспоринів та фторхінолонів, будуть неефективні. До тигецикліну, колістину В та фосфоміцину виявляє стійкість менше від 25 % ізолятів *P.aeruginosa* та *Acinetobacter* spp. Виявлено штами з однаковими комбінаціями детермінант стійкості, такі штами виявляються навіть у географічно віддалених госпіталах. **Висновки.** Полірезистентність мікроорганізмів, факти об'єднання штамів в однакові фенотипи резистентності, що виявляються в різних госпіталах, вказують на те, що сучасні бойові поранення контамінуються спорідненими клональними популяціями, які мають єдине госпітальне джерело походження. Розробляти заходи антибактеріальної терапії потрібно в масштабах усього лікувально-евакуаційного ланцюга, без урахування локальних особливостей резистентності.

Ключові слова: госпітальна хірургічна інфекція; локальний мікробіологічний моніторинг; *Acinetobacter baumannii*; *Pseudomonas aeruginosa*; антибіотикорезистентність; антибіотикотерапія

Вступ

Є істотні відмінності в спектрі мікроорганізмів, що виділяються з ран, при різних військових конфліктах [1]. Результати мікробіологічного моніторингу мікрофлори ран є важливими для оцінки ефективності існуючої тактики лікувальної допомоги. З початком АТО у 2014 році перед військовими лікарями постав новий виклик — бойові травми. Це зазвичай тяжкі поранення, що характеризуються

зоною некрозу, а також неминучим первинним мікробним забрудненням. Лікарі зробили спостереження, що значна кількість таких поранень після прибуття постраждалих на кінцевий етап лікування мають ознаки хірургічної інфекції. Подібні спостереження були й при інших військових конфліктах. Під час військових операцій США в Іраку та Афганістані реєстрували інфекційні ускладнення, викликані полірезистентними мікроорганізмами, а саме

комплексом *Acinetobacter baumannii-calcoaceticus* [2]. Тенденцією сьогодення в хірургічних стаціонарах України є зростання частки неферментуючих грамнегативних паличок серед етіологічних чинників госпітальних інфекційних ускладнень [3]. Усе це спонукало провести аналіз етіологічної ролі *A.baumannii* та *P.aeruginosa* в розвитку хірургічної інфекції бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) поранень кінцівок за період 2014–2015 рр. у різних військово-медичних клінічних центрах (ВМКЦ).

Мета роботи: обґрунтувати вибір раціональної антибактеріальної терапії та профілактики спричиненої цими мікроорганізмами госпітальної хірургічної інфекції бойових поранень кінцівок.

Матеріали та методи

У трьох військово-медичних клінічних центрах (міста Київ, Львів, Вінниця) проведено аналіз результатів бактеріологічних досліджень бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) поранень кінцівок. Для дослідження відібрали результати посівів ран, що локалізовані на кінцівках (без зв'язку з грудною або червеною порожниною) у періоди липень — листопад 2014 року та лютий — березень 2015 р. До уваги не брали штами, що виділялись повторно. Антибактеріальні засоби для аналізу чутливості кожного виділеного штаму мікроорганізму були відібрані згідно з Наказом МОЗ України № 167 та з урахуванням госпітальної політики із застосування антибіотиків. Розподіл штамів, що спричиняють розвиток нозокоміальних інфекцій, на полірезистентні (multidrug-resistant (MDR)) та штами з розширеною резистентністю (extensively drug-resistant (XDR)) провели відповідно до пропозицій EUCAST [4]. Профілі резистентності досліджених штамів отримували відповідно до Наказу МОЗ України № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів». За критерієм Пірсона χ^2 проводили порівняння часток штамів, резистентних до окремих препаратів, між різними ВМКЦ.

Результати

Проаналізовано результати 326 бактеріологічних обстежень, що відповідали умовам дослідження. Для аналізу були доступні дані про ідентифікацію та антибіотикограми 378 мікроорганізмів. У бактеріологічних дослідженнях, проведених у Головному військово-медичному клінічному центрі (ГВМКЦ), м. Київ, із числа 191 виділеної культури 78,5 % становили грамнегативні палички, 21 % — грампозитивні коки. Частота виділення *Pseudomonas* spp. становила 26,7 %, *Acinetobacter* spp. — 9,42 %. Серед 72 культур, що були виділені від поранених у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону (ВМКЦ ЗР), м. Львів, 8 випадків становили *P.aeruginosa* та п'ять — *A.baumannii*. 117 культур були отримані у Військово-медичному клінічному центрі




Рисунок 1. Узагальнені результати бактеріологічного дослідження поранених, які лікувались у військово-медичних клінічних центрах

Центрального регіону (ВМКЦ ЦР), м. Вінниця. З числа виділених культур 65 % становили грамнегативні палички, 22,2 % — грампозитивні коки, решта (12,8 %) — грампозитивні палички. За частотою наявності в позитивних висівах домінували грамнегативні неферментуючі палички (58 %), які в 45,3 % випадків належали до роду *Acinetobacter*, а у 12,8 % випадків — до роду *Pseudomonas*. Співвідношення різних мікроорганізмів у спектрі ранових контамінант без урахування географічної різниці наведено на рис. 1.

Представники родини *Enterobacteriaceae* становлять третину від усіх мікроорганізмів, за ними розташувались мікроорганізми роду *Acinetobacter* — 20,1 %, а представники роду *Pseudomonas* зустрічались у 19,6 % випадків. Слід врахувати, що за своїми фенотиповими властивостями ці роди об'єднуються мікробіологами в єдину групу неферментуючих грамнегативних паличок. Отже, частка грамнегативних паличок роду *Acinetobacter* та роду *Pseudomonas* сягає майже 40 % по всіх госпіталях і виявляється найбільшою.

У такій ситуації особливого значення набувають дані про чутливість представників цієї численної групи до антибактеріальних препаратів. Результати проведеного вивчення антибіотикорезистентності виділених з поранень штамів *P.aeruginosa* наведено на рис. 2.

Найвищою резистентністю до антибіотиків характеризувались штами *P.aeruginosa*. Непокій той факт, що до препаратів, які в межах своїх класів відрізняються наявністю антипсевдомонадної активності, стійкість виявляло близько 75 % штамів незалежно від того, у якому лікувальному закладі вони були виділені. Рівень резистентності штамів *P.aeruginosa* щодо карбапенемів становив від 46 до 87,5 %. Частота виявлення резистентних штамів




Рисунок 2. Характеристика резистентності 33 штамів *P.aeruginosa*, виділених у ГВМКЦ (м. Київ) та ВМКЦ ЗР (м. Львів)

P.aeruginosa до іміпенему та меропенему в хірургічних стаціонарах Києва у 2008 році становила $14,2 \pm 2,4\%$ і $15,3 \pm 2,0\%$ відповідно [5]. У 2010 році резистентність *P.aeruginosa* до карбапенемів в окремих країнах світу сягала 50 % [6]. Національними дослідженнями встановлено високий рівень поширення метало- β -лактамаз серед штамів *P.aeruginosa* [7]. Втрата активності цієї групи препаратів безпосередньо пов'язується з їх широким застосуванням [8]. Значимою була різниця в частоті виділення іміпенемрезистентних штамів *P.aeruginosa* між ГВМКЦ (м. Київ) та рештою госпіталів ($p < 0,05$), а також у частоті виділення меропенемрезистентних штамів між ГВМКЦ (м. Київ) та ВМКЦ ЦР (м. Вінниця) ($p < 0,05$). Встановлена низька активність фторхінолонів, що вказує на необхідність перегляду їх ролі в боротьбі з *P.aeruginosa*. Це можна пояснити тривалим застосуванням цих хіміопрепаратів, що, як доведено, стимулює розвиток резистентності в псевдомонад [9]. Стійкість *P.aeruginosa* до амікацину мала локальні розбіжності між ГВМКЦ (33 % стійких штамів) та госпіталями Вінниці та Львова — 89 та 75 % відповідно ($p < 0,05$). Виявлені штами з перехресною чутливістю до гентаміцину й амікацину. Слід визнати неефективність цефалоспоринових та їх захищених форм у боротьбі з псевдомонадами. Препаратами, стійкість до яких виявляє менше ніж 25 % ізолятів *P.aeruginosa*, виявились тигециклін, колістин В та фосфоміцин.

Ізоляти *Acinetobacter* завдяки наявності кількох механізмів резистентності, що реалізуються різними шляхами, виявили стійкість до більшості протестованих антибіотиків [10, 11]. Тривалий час карбапенемами визнавались основними засобами в

боротьбі з акінетобактеріями. Дослідження MYSTIC у 2000 році показало чутливість акінетобактерій до карбапенемів на рівні 97–100 % [12]. Проте за останні роки в межах України ця ситуація прогресивно погіршувалась, частка резистентних штамів сягнула 80–90 % [3]. Сьогодні за рахунок поширення β -лактамаз карбапенемами втрачають ефективність. Частка карбапенемрезистентних штамів серед *Acinetobacter* spp. становила від 71 до 100 %. Але встановлена різниця в локальній чутливості штамів *Acinetobacter* spp. до обох карбапенемів між ВМКЦ ЦР (м. Вінниця) та ГВМКЦ (м. Київ) ($p < 0,05$). На щастя, не всі представники цього класу антибіотиків піддаються впливу механізмів резистентності, про що свідчить відчутно вищий рівень чутливості до іміпенему у ГВМКЦ.

Здатність *Acinetobacter* spp. продукувати β -лактамази різних типів та поєднувати різні варіанти резистентності, обумовленої лактамазами, у межах одного штаму привела до повної втрати значення цефалоспоринових. Виділені ізоляти демонстрували різноманітні поєднання чутливості/резистентності до гентаміцину та амікацину. Високий рівень чутливості акінетобактерій встановлено до препаратів, що містять у своєму складі інгібітори лактамаз. Ефективність цих антибіотиків прирівнюється до такої в карбапенемів та поліміксину, а реалізується вона за рахунок сульбактаму [13].

Усі виділені штами *Acinetobacter* spp. були чутливими до тигецикліну й колістину. Абсолютно рекомендованим для боротьби з неферментуючими грамнегативними бактеріями на сьогодні є коломіцин. Частка стійких штамів по всіх ВМКЦ не перевищувала 25 %, тобто порогу, рекомендованого Наказом МОЗ України № 236.

Відповідно до пропозицій EUCAST провели розподіл штамів, що спричиняють розвиток нозокоміальних інфекцій, на три типи профілів. Штами, що виявили резистентність хоча б до одного антибіотика з трьох різних груп, віднесено до полірезистентних (MDR). Штами, що виявили чутливість тільки до 1 чи 2 окремих препаратів із рекомендованого переліку, віднесено до штамів із розширеною резистентністю (XDR) [4].

Неферментуючі грамнегативні палички з розширеною резистентністю виявлялись у всіх госпіталях. Найбільшу кількість таких бактерій виявлено серед псевдомонад у ВМКЦ ЦР (м. Вінниця) та ВМКЦ ЗР (м. Львів). Штами *P.aeruginosa* з фенотипом nMDR зовсім не виявлено у львівському госпіталі. Усі штами акінетобактерій, що виділені у ВМКЦ ЦР, належали до полірезистентних або штамів із розширеною резистентністю. Серед *A.baumannii*, що були виділені в Києві та Львові, лише близько третини виявляли чутливість до більшості хіміотерапевтичних препаратів. При статистичному порівнянні частки грамнегативних паличок, віднесених до MDR або XDR, між різними госпіталями значимої різниці не встановлено ($\chi^2 > 0,05$). Це дає підстави стверджува-

ти, що у всіх ВМКЦ, незалежно від їх географічного розташування, поранення кінцівок колонізуються переважно полірезистентними штамми.

Аналіз профілів антибіотикорезистентності дає змогу проаналізувати інформацію про поширення резистентності й розробити належні заходи щодо контролю та стримування поширення цього явища. Саме деталізація профілів резистентності дає змогу визначити наявність епідеміологічно пов'язаних між собою штамів мікроорганізмів та стверджувати, що вони походять зі спільного джерела. При побудові профілів підбирали антибіотики, до яких бактерії виявили гетерогенну чутливість, а резистентність має різні генетичні механізми. Сформований для типування мікроорганізмів профіль резистентності виглядав так: Q — цефотаксим, W — цефоперазон, U — цефоперазон/сульбактам, I — ампіцилін/клавуланат, E — меронем, R — іміпенем, T — амікацин, Y — ципрофлоксацин, O — коломіцин. У табл. 1 наводяться профілі резистентності, що об'єднали по кілька штамів, виділених із ран у різних ВМКЦ.

Серед виділених штамів *P.aeruginosa* виявлені такі, що мали стійкість одночасно до 5–9 антибіотиків. Одночасно спостерігалась резистентність до двох та більше антибіотиків у різних комбінаціях. Найчастіше поєднувалась стійкість до протипсевдомонадних цефалоспоринів, їх захищених форм, фторхінолонів та карбапенемів. З епідеміологічного погляду привертає увагу факт виділення штамів *P.aeruginosa* з однаковими поєднаннями детермінант стійкості в географічно віддалених ВМКЦ. Серед 25 штамів *A.baumannii*, отриманих у ВМКЦ ЦР (м. Вінниця), 24 групувались у п'ять різних профілів резистентності.

В один із них входило 12 штамів. Як і у випадку з псевдомонадами, для *A.baumannii* виявлені два профілі, ідентичні між різними госпіталами. Комбінації стійкості до окремих хіміотерапевтичних препаратів були аналогічними до таких у псевдомонад.

Обговорення

У всіх госпіталах найчастіше з ран кінцівок виділяються грамнегативні палички. Проте у ГВМКЦ м. Києва та ВМКЦ м. Львова панують різні види ентеробактерій, а у ВМКЦ м. Вінниці — грамнегативні неферментуючі палички, зокрема акінетобактерії. Імовірно, що ці відмінності відображають особливості мікроекології кожного з лікувальних закладів.

Слід визнати, що існуючі рекомендації з антибактеріальної терапії госпітальних хірургічних інфекцій, до яких входить монотерапія карбапенемами та комбінації з включенням цефалоспоринів та фторхінолонів, у більшості випадків продовжать стимулювати антибіотикорезистентність. Препаратами, стійкість до яких виявляє менше ніж 25 % ізолятів *P.aeruginosa* та *Acinetobacter* spp., є тигециклін, колістин В та фосфоміцин.

За своїми ознаками та ступенем охоплення даний моніторинг є спрямованим, а отримана інформація є індикатором стану антибіотикорезистентності в усій популяції поранених з вогнепальними та мінновиховними ушкодженнями в цілому. Встановлено, що за станом чутливості до різних класів хіміотерапевтичних препаратів більшість неферментуючих грамнегативних паличок належить до полірезистентних або штамів із розширеною резистентністю. Найбільше штамів із розширеною резистентністю

Таблиця 1. Фенотипова характеристика однотипних за поєднанням детермінант стійкості до антибіотиків штамів *P.aeruginosa* та *A.baumannii*, виділених із ран у різних ВМКЦ

ГВМКЦ, м. Київ	п	ВМКЦ ЗР, м. Львів	п	ВМКЦ ЦР, м. Вінниця	п
<i>P.aeruginosa</i>					
QWUIERTY*	2	QWUIERTY*	4	QWUERTY	2
QWUI	4	QWIERTY**	1	QWIERTY**	1
QWUIERTYO	4	QWIR	2		
QW	2				
WI	2				
<i>A.baumannii</i>					
QWUIERTY#	3	QWUIERTY#	1	QWUIERTY#	3
QWIERTY#	2	QWIERTY#	1	QWIERTY#	12
QWUIEY	2	QWIETY	2	QWUIE	5
				QWIERY	2
				QWIEY	2

Примітки: * — штам з таким фенотипом виділені у ГВМКЦ (м. Київ) та ВМКЦ ЦР ЗР (м. Львів); ** — штам з таким фенотипом виділені у ВМКЦ ЦР (м. Вінниця) та у ВМКЦ ЗР (м. Львів); # — штам з таким фенотипом виділені у ГВМКЦ (м. Київ), ВМКЦ ЗР (м. Львів) та ВМКЦ ЦР (м. Вінниця).

виділяється у ВМКЦ ЦР (м. Вінниця) та ВМКЦ ЗР (м. Львів). Серед *P.aeruginosa* та *A.baumannii* виділені групи штамів, що за комбінаціями детермінант стійкості об'єднуються в однакові фенотипи. Зіставлення цих фенотипів виявило, що штами, однакові за комбінаціями детермінант стійкості, виявляються далеко поза межами одного лікувального закладу. Слід наголосити, що виділення однакових за фенотипом резистентності штамів реєструється від поранених з однаковою хірургічною патологією та з одного й того ж клінічного матеріалу.

Поранені, включені до обстеження, проходили етапне лікування в ланцюзі медичної допомоги, що створений медичною службою Збройних сил України. На своєму шляху вони перебували на одних етапах евакуації та переміщались на одному евакуаційному транспортному засобі (операційно-реанімаційному літаку). Переміщення зі Сходу України на відстань понад 1000 км відбувалось менше ніж за три доби. Факти передачі резистентних бактерій з одного міста до іншого встановлені і в інших країнах [14]. Виявлення маркерів поліантибіотикорезистентності є одним з епідеміологічних критеріїв госпітального походження ізолятів. Разом це аргумент на користь того, щоб розглядати таке засилля ран антибіотикорезистентними мікроорганізмами як результат нозокоміальної трансмісії.

Висновки

1. Ефективними препаратами щодо неферментуючих грамнегативних паличок є тигециклін, колістин В та фосфоміцин. Стійкість до них виявляє менше від 25 % ізолятів *P.aeruginosa* та *Acinetobacter* spp.

2. Епідеміологічні характеристики обстеженого контингенту, наявність полірезистентності ранових ізолятів, встановлення фактів об'єднання декількох штамів у однакові фенотипи резистентності, що виявляються у географічно віддалених госпіталях, вказують на те, що сучасні бойові поранення контамінуються спорідненими клональними популяціями, які мають єдине джерело походження, найбільш ймовірно, госпітальне.

3. Виявлення серед ранових ізолятів кількох клональних популяцій, що мають єдине джерело походження, дає підстави розробляти заходи антибактеріальної терапії та профілактики в масштабах усього лікувально-евакуаційного ланцюга, а не зосереджувати увагу лише на локальних особливостях резистентності в межах окремих військових госпіталів.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.

Список літератури

1. Hutley E.J. *Infection in wounds of conflict — old lessons and new challenges* / E.J. Hutley, A.D. Green // *JR. Army Med. Corps.* — 2009. — Vol. 155, № 4. — P. 315-319.

2. *Pathogens present in acute mangled extremities from Afghanistan and subsequent pathogen recovery* / T.E. Wallum,

H.C. Yun, E.A. Rini [et al.] // *Mil. Med.* — 2015. — Vol. 180, № 1. — P. 97-103.

3. *Сучасні підходи до вибору антибіотикотерапії шпитальної хірургічної інфекції, яка спричинена Acinetobacter baumannii* / О.М. Нестеренко, Ю.В. Шербина, І.М. Бойцун [та ін.] // *Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія.* — 2015. — № 2(6). — С. 28-37.

4. *European committee on antimicrobial susceptibility testing (EUCAST). EUCAST disk diffusion test methodology.* — Mode of access: at: WWW.URL: www.eucast.org/ast_of_bacteria/disk_diffusion_methodology/updated_26_January_2015. — Last access: 2015. — Title from the screen.

5. *Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa в хірургічних стаціонарах України в 2008 році* / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // *Шпитальна хірургія.* — 2010. — № 3. — С. 86-89.

6. *Epidemiology and characteristics of metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa* / D.J. Hong, I.K. Bae, I.H. Jang [et al.] // *Infect. Chemother.* — 2015. — Vol. 47, № 2. — P. 81-97.

7. *Розповсюдженість карбапенемрезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa — продуцентів метало-β-лактамаз* / К.М. Нестерук, І.Є. Соколова, О.В. Братусь // *Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина.* — 2011. — Вип. 2, м. 1. — С. 95-100.

8. *A systematic review and meta-analyses show that carbapenem use and medical devices are the leading risk factors for carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa* / A.F. Voor, J.A. Severin, E. M. Lesaffre [et al.] // *Antimicrob. Agents Chemother.* — 2014. — Vol. 58, № 5. — P. 2626-2637.

9. *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and fluoroquinolone use* / C. MacDougall, E. Spencer, S.E. Harpe [et al.] // *Emerg. Infect. Dis.* — 2005. — Vol. 11, № 8. — P. 1197-1210.

10. *Acinetobacter baumannii: emergence of a successful pathogen* / A.Y. Peleg, H. Seifert, D.L. Paterson // *Clin. Microbiol. Rev.* — 2008. — Vol. 21. — P. 538-582.

11. *Kempf M. Emergence of resistance to carbapenems in Acinetobacter baumannii in Europe: clinical impact and therapeutic options* / M. Kempf, J.M. Rolain // *The International Journal of Antimicrobial Agents.* — 2012. — Vol. 39, № 2. — P. 105-114.

12. *Turner P.J. MYSTIC (Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection): a global overview* / P.J. Turner // *J. Antimicrob. Chemother.* — 2000. — Vol. 46 (Suppl. T2). — P. 9-23.

13. *Molecular mechanisms of sulbactam antibacterial activity and resistance determinants in Acinetobacter baumannii* / W.F. Penwell, A.B. Shapiro, R.A. Giacobbè [et al.] // *Antimicrob. Agents Chemother.* — 2015. — Vol. 59. — P. 1680-1689.

14. *Recovery of multidrug-resistant bacteria from combat personnel evacuated from Iraq and Afghanistan at a single military treatment facility* / C.K. Murray, H.C. Yun, M.E. Griffith [et al.] // *Mil. Med.* — 2009. — Vol. 174, № 6. — P. 598-604.

Отримано 13.01.2017 ■

Кондратюк В.Н.

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, г. Винница, Украина

Оценка резистентности к антимикробным препаратам штаммов *Acinetobacter baumannii* и *Pseudomonas aeruginosa*, контаминирующих боевые ранения конечностей

Резюме. Актуальность. Боевые ранения конечностей, количество которых стремительно возросло с 2014 года, часто осложняются развитием хирургической инфекции. Современной тенденцией является рост доли неферментирующих грамотрицательных палочек среди этиологических факторов госпитальных хирургических инфекционных осложнений.

Цель исследования: обосновать выбор рациональной антибактериальной терапии и профилактики вызванной этими микроорганизмами госпитальной хирургической инфекции ранений конечностей. **Материалы и методы.** В трех военно-медицинских клинических центрах (города Киев, Львов, Винница) проведен анализ результатов бактериологических исследований боевых ранений. Анализ устойчивости к антибиотикам и профилям резистентности проводили в соответствии с рекомендациями EUCAST и национальными рекомендациями по инфекционному контролю. Сравнение резистентности к отдельным препаратам проводили по критерию Пирсона χ^2 . **Результаты.** Проанализированы результаты 326 бактериологических исследований, из которых получены данные о 378 микроорганизмах. На долю палочек рода *Acinetobacter* и рода *Pseudomonas* приходится 40 % среди всего спектра контаминант боевых ранений конечностей. По состоянию чувствительности к различным химиотерапевтиче-

ским препаратам большинство изолятов относится к полирезистентным или штаммам с расширенной резистентностью. Рекомендации по антибактериальной терапии госпитальных хирургических инфекций, в которые входит монотерапия карбапенемами и комбинации с включением цефалоспоринов и фторхинолонов, будут неэффективны. К тигециклину, колистину В и фосфомицину проявляет устойчивость менее 25 % изолятов *P.aeruginosa* и *Acinetobacter* spp. Выявлены штаммы с одинаковыми комбинациями детерминант устойчивости, такие штаммы выделяются даже в географически отдаленных госпиталях. **Выводы.** Полирезистентность у микроорганизмов, факты объединения штаммов в одинаковые фенотипы резистентности, выделяемые в разных госпиталях, указывают на то, что современные боевые ранения контаминируются родственными клональными популяциями, имеющими единый госпитальный источник происхождения. Разрабатывать мероприятия антибактериальной терапии нужно в масштабах всей лечебно-эвакуационной цепи, без учета локальных особенностей резистентности.

Ключевые слова: госпитальная хирургическая инфекция; локальный микробиологический мониторинг; *Acinetobacter baumannii*; *Pseudomonas aeruginosa*; антибиотикорезистентность; антибиотикотерапия

V.M. Kondratiuk

Military-Medical Clinical Center of Central Region, Vinnytsia, Ukraine

Evaluation of antimicrobial resistance of *Acinetobacter baumannii* and *Pseudomonas aeruginosa* strains, which contaminate combat wounds of the extremities

Abstract. Background. The number of battle wounds of the extremities has grown rapidly since 2014. They are often complicated by surgical infection. The growth of non-fermenting Gram-negative bacilli among the etiological factors of nosocomial surgical infectious complications is the current trend. The purpose of research is to justify the selection of rational antibiotic therapy and prevention of nosocomial infections of combat wounds of the extremities caused by these microorganisms. **Materials and methods.** In three military medical clinical centers (Kyiv, Lviv, Vinnytsia), the results of bacteriological studies of combat wounds were analyzed. Analysis of antibiotic resistance and resistance profiles were performed in accordance with the EUCAST recommendations and national guidelines for infection control. Comparison of resistance to individual drugs was performed by Pearson χ^2 . **Results.** Three hundred twenty six results of bacteriological studies contained data about 378 microorganisms. The incidence of genus *Acinetobacter* and *Pseudomonas* was 40 % among entire number of contaminants of combat wounds. According to resistance to antibiotics, most strains were multidrug-

resistant or strains with enhanced resistance. Recommendations for antibiotic therapy of nosocomial surgical infections that include monotherapy with carbapenems and combinations contained cephalosporins and fluoroquinolones are ineffective. No more than 25 % of isolated *P.aeruginosa* and *Acinetobacter* spp. were resistant to tige-cycline, colistin B and fosfomycin. Analysis revealed strains with the identical combinations of resistance determinants, such strains were isolated even in geographically dispersed hospitals. **Conclusions.** The multidrug resistance of microorganisms, as well as facts that strains with the identical combination of resistant phenotypes allocated in different hospitals, both indicate that modern combat wounds are contaminated by clonal populations, which have a single source of hospital origin. The measures of antibiotic therapy have to be developed for the entire evacuation chain, without taking into account local resistance in each hospital.

Keywords: nosocomial surgical infection; local microbiological monitoring; *Acinetobacter baumannii*; *Pseudomonas aeruginosa*; antibiotic resistance; antibiotic therapy