

**ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО СИСТЕМНОГО МЕТОДУ
ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 1-2 СТУПЕНЯ.**

Баранова І.В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Комплексне лікування із застосуванням НІЛВ дозволяє підвищити ефективність лікування АГ I-II ст. Особливістю методики БРСЛ є багаторівневий принцип впливу на основні рівні регуляції системи кровообігу: надсегментарний, сегментарний та периферичний, що проявляється в нормалізації функціонального стану вегетативної нервової системи, оптимізації ліпідного спектру крові, поліпшення реологічних властивостей крові та мікроциркуляції.

Загальна дія НІЛВ на організм людини дозволяє підвищити потенціал саногенетичних реакцій в організмі, дозволяє покращити адаптаційні можливості та збільшити функціональний резерв серцево-судинної системи, що значно поліпшує якість життя хворих на АГ.

Використання немедикаментозних методів лікування, а саме лазеротерапії, дозволяє потенціювати дію гіпотензивних препаратів, тим самим знижати дозу та уникати багатьох проявів побічних дій сильно діючих медикаментозних засобів.

Є доцільним використання багаторівневої системної лазеротерапії в комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії I-II ст. на стаціонарному, поліклінічному та санаторно-курортному етапі лікування