

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Студентське наукове товариство
Рада молодих вчених

МАТЕРІАЛИ
XVIII Наукова конференція студентів та молодих вчених
«Перший крок в науку — 2021»

15-17 квітня 2021 року
м. Вінниця

УДК: 061.3:001:616-053.82+378.22

Друкується відповідно до рішення Вченої Ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Головний редактор – академік Національної академії медичних наук України
проф. В. М. Мороз.

Заступники головного редактора – проф. О. В. Власенко, проф. Н. І. Волощук.

Відповідальні секретарі – О. А. Філевич, Н. М. Назарчук.

Члени редакційної колегії: О. Г. Басінських, В. В. Ковальчук, К. О. Кошова, А. О. Куцало, Н. М. Назарчук, Д. О. Пермінов, А. О. Петренко, О. М. Плавков, О. І. Сушицька, С. С. Ткачук, Н. В. Толочко, О. А. Філевич

У збірнику розміщені матеріали XVIII Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2021»

За зміст опублікованих матеріалів відповідальність несуть автори

Підписано до друку 25.03.2021
Формат 64х90/8. Папір офсетний.
Друк різнографічний. Гарнітура Times New Roman.
Умов. друк. арк. 73,0. Обл.-вид. арк. 67,89.
Наклад 170 прим. Зам. № 2327/1.
Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д.Ю.
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.
Тел.: (0432) 603-000, 69-67-69

«задовільний». Середні показники відповідали таким значенням – $20,08 \pm 0,18$.

Висновки: Таким чином, можна стверджувати, що застосування іригатора AQUAJET H2OFLOSS 2 рази на добу сприяє ефективному очищенню міжзубних проміжків з достовірністю 95%. Крім того, використання іригатору має ряд переваг перед іншими засобами для очищення міжзубних проміжків, так як він є простий у застосуванні, не потребує додаткових зусиль зі сторони пацієнта, не травмує ясна, додатково проводить гідромасаж тканин пародонта та має доступну ціну у порівнянні із іншими іригаторами.

А. О. Гаврилюк, В. С. Поліщук, О. О. Поліщук, А. І. Даліщук
**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ АЛЬВЕОЛІТІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
МУДРОСТІ НА НИЖНІЙ ЩЕЛПІ**

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Поліщук С.С.(д.мед.н., доцент)

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

м. Вінниця, Україна

Актуальність. Проблема етіології та патогенезу виникнення та лікування альвеолітів після видалення зубів залишається на сьогодні досить актуальною. Адже часто при видаленні однієї групи зубів та складності, виникнення альвеоліту прогнозувати не приходить. Важливим моментом при цьому залишається догляд за порожниною роти та лункою видаленого зуба.

Мета – дослідити вплив Альвожилу на лікування альвеоліту при видаленні зубів мудрості на нижній щелепі.

Матеріали та методи. Проведено дослідження 43 пацієнтів віком від 21 до 43 років, що зверталися лікувалися в МКЛ ШМД щелепно-лицевому відділенні з альвеолітами, яким була проведена операція «Перикоронаротомія та хірургічне видалення 38(48) зубів» 3-5 днів тому. В процесі роботи хворі було розділено на 2 групи: I – контрольна (без використання Альвожилу), II – пацієнти в лунку 38 чи 48 зуба було внесено Альвожил. Для оцінки впливу Альвожилу визначали терміни епітелізації лунок видалених 38(48) зубів.

Результати: В результаті дослідження виявлено 32 пацієнтів (74,4%) в яких не було зареєстровано супутньої патології та 11 пацієнтів(25,6%) із порушенням функції гепатобіліарного тракту. У пацієнтів I групи – 32 пацієнти (74,4%) середній термін епітелізації лунок видалених зубів склав $19,7 \pm 2,5$ дні, а кількість повторних звернень склав 3 клінічних випадки (9,4%). На противагу даним першої групи терміни епітелізації лунок видалених зубів у пацієнтів II групи – 11 пацієнтів(25,6%), були триваліші ніж у першій та склав $28,4 \pm 3,6$, а кількість повторних звернень склав 4 клінічних випадки (36,4%).

Висновок. При використанні Альважилу для лікування альвеоліту після видалення зубів мудрості на нижній щелепі зменшується тривалість епітелізації лунок на $8,5 \pm 2,3$ діб. При цьому фіксується зменшення кількості повторних звернень в 3,9 рази, що дозволяє стверджувати про позитивний вплив запечатування лунки Альважилом при лікуванні альвеолітів після видалення зубів мудрості на нижній щелепі.